

学校等重点场所 诺如病毒感染防控消毒技术指南

学校、托幼机构和养老机构等人群聚集场所,容易出现诺如病毒感染性腹泻聚集性疫情。针对该情况,国家疾控局专门印发《学校等重点场所诺如病毒感染防控消毒技术指南》,对场所中不同场景的消毒方法进行指导。

该指南将消毒方法分为 疫情发生后的终末消毒 和 感染流行期间的预防性消毒 两个方面,我们根据内容特制作一图读懂,便于公众理解、学习。

一 诺如病毒感染疫情发生后 如何进行终末消毒

01 处置原则

- 发现诺如病毒感染患者后,应及时对其进行隔离,尽快采取消毒措施。当患者在教室或集体宿舍等人群密集场所发生呕吐时,应立即引导其他人员向相对清洁的方向转移,并对呕吐物进行消毒处理。
- 重点消毒患者呕吐物、排泄物等污染物及其污染的环境物体表面、生活用品、食品、餐(饮)具、厕所等。

02 常见污染对象的消毒方法

诺如病毒对常用消毒剂抵抗力较强,酒精对其无效,应选用高水平消毒剂或有效的物理消毒方法。

1 患者呕吐物、排泄物

对患者呕吐物、排泄物等大量污染物应使用含吸水成分的消毒粉或漂白粉完全覆盖,或能达到高水平消毒的消毒干巾完全覆盖,消毒至作用时间后,小心清除干净;少量污染物可用一次性吸水材料(如纱布、抹布等)沾取有效氯5000mg/L-10000mg/L的含氯消毒剂,完全覆盖,作用30分钟以上,小心清除干净。

清除过程中避免接触污染物,清理的污染物按医疗废物集中处置。清除污染物后,对其表面及周边区域用有效氯1000mg/L的含氯消毒剂或其他高水平消毒剂进行喷洒或擦拭,消毒作用30分钟。

清洁中使用的拖把、抹布等工具,盛放污染物的容器应使用有效氯5000mg/L的含氯消毒剂溶液浸泡消毒30分钟后彻底冲洗,才可再次使用。厕所、卫生间的拖把应专用。

2 地面、墙壁及物体表面

有肉眼可见污染物时,应先清除污染物再消毒。无肉眼可见污染物时,可用有效氯1000mg/L的含氯消毒剂作用30分钟,或其他高水平消毒剂进行喷洒、擦拭或浸泡消毒。

3 衣物、被褥等织物

收拾被污染的衣物、被褥等织物时应避免产生气溶胶。先将污染物消毒处理并移除后,用有效氯500mg/L的含氯消毒剂浸泡消毒30分钟;也可用流通蒸汽消毒或煮沸消毒30分钟。若不能即时消毒,应放置在密封袋内,并尽快处理。

二 诺如病毒感染流行期间 重点场所的预防性措施

疾控机构要指导学校、托幼机构和养老机构等重点场所做好本单位的预防性消毒工作。

1 制定本单位诺如病毒感染等肠道传染病防控预案,建立日常环境清洁消毒制度,健全领导责任制,并将责任分解到部门、单位和个人。

2 开展多种形式的健康宣教。组织开展呕吐物和环境消毒方法、正确洗手等培训;提高防护意识和消毒能力,规范个人卫生行为。

3 配备充足的消毒物资及个人防护物资,学校、托幼机构、养老机构等需常规储备一次性呕吐袋、呕吐污染物应急处置用品。配备充足的洗手设施及洗手液、肥皂。

4 单位员工/学校师生养成良好的个人卫生习惯,坚持勤洗手、勤剪指甲;进食或处理食物前、如厕后用肥皂或洗手液在流动水下彻底洗净双手。

5 做好办公场所、教学场所及宿舍环境卫生;保持厕所清洁卫生;可对重点部位(如门把手、楼梯扶手、水龙头、便器按钮、电梯按钮、上下床扶手等)定期使用含氯消毒剂或其他适宜消毒剂进行预防性消毒;生活垃圾应集中、分类存放并在存放容器上加盖,定期清理生活垃圾,保持环境卫生。

6 单位/学校需落实员工、师生的晨午检制度、因病缺勤缺课追踪登记制度,发现腹泻患者异常增多时,立即按照相关要求报告。

7 若有员工(尤其是厨工及食品从业人员、保育员、供水水人员)或学生出现呕吐、腹泻、腹痛等症状,不得带病上岗(课),必要时前往医院就医。

8 加强对双壳贝类等水产品的烹调加工控制,保证食物彻底煮熟煮透,避免交叉污染。

9 发生疫情的学校、托幼机构等重点场所要加强餐(饮)具的消毒。

三 诺如病毒感染流行期间 不同对象的预防性消毒

日常预防性消毒首选物理消毒方法,使用化学方法消毒时,优先选择刺激性小、对环境影响小的消毒剂。应使用符合国家标准规范的消毒器械和消毒剂,严格按照消毒产品说明书规定的使用范围和使用方法,在有效期内使用。应“专人专区”妥善保管消毒产品及相关用品,明确标识。

1 环境和物体表面

可用有效氯250mg/L-500mg/L的含氯消毒剂进行擦拭、喷洒或浸泡消毒,作用30分钟后,用清水擦拭干净;或选用有效的消毒湿巾擦拭等其他适宜消毒方式。

2 餐(饮)具

使用后的餐(饮)具先去除残渣、清洗后,首选煮沸消毒或流通蒸汽消毒,作用15分钟,或采用有效氯250mg/L-500mg/L含氯消毒剂浸泡消毒30分钟,再用清水洗净。

3 拖布和抹布等卫生用具

使用过的拖布、抹布用有效氯500mg/L的含氯消毒剂浸泡消毒30分钟,清洗后晾干备用,拖布、抹布应专区专用,避免交叉感染。

4 衣服、被褥、毛巾等织物

反复使用的毛巾应做到一人一巾,每日消毒,定期更换。床上用品应做到一人一套,定期清洗,有明显污渍时应及时更换、清洁、消毒。

衣服、被褥、毛巾等织物清洗干净后,置阳光下曝晒干燥,也可用煮沸消毒或流通蒸汽消毒,作用15分钟。毛巾类织物也可使用有效氯250mg/L-500mg/L含氯消毒剂浸泡消毒,作用30分钟后用清水洗净。

5 手、皮肤

以流动水洗手为主,在接触可疑污染环境后可用对肠道病毒有效的手消毒剂或皮肤消毒剂进行擦拭消毒。

(来源:中国疾控中心 微信公众号《一图读懂|学校等重点场所诺如病毒感染防控消毒技术指南》)